

Nowe stanowiska *Leptinus testaceus* MÜLLER, 1817 (Coleoptera: Leiodidae: Platypsyllinae) w Polsce

New records of *Leptinus testaceus* MÜLLER, 1817 (Coleoptera: Leiodidae: Platypsyllinae) from Poland

Leptinus testaceus MÜLLER, 1817, występuje w całej Polsce, jest jednak rzadko łowiony ze względu na skryty tryb życia (ektopasożyt drobnych gryzoni). Najczęściej jest pozyskiwany metodą przesiewania ściółki w pobliżu nor gryzoni, zwłaszcza występujących w środowisku leśnym.

– Górny Śląsk: rezerwat Las Murckowski [UTM CA66], 6 X 2001 – 1 ex., wysiany z butwiejącego pniaka dębu z widocznymi licznymi korytarzami gryzoni. Nowy dla krainy.

– Beskid Zachodni: Cisownica [CA30], 27 VI 2001 – 1 ex., wysiany ze ściółki bukowej w suchym jarze potoku. Z tej krainy wykazany w drugiej połowie XIX wieku z Babiej Góry.

– Bieszczady: Ustrzyki Górne [FV24], 6 VI 2001 – 1 ex., wysiany na brzegu potoku. W tej krainie wykazany niedawno z okolic Komańczy i Wetliny.

Okazy dowodowe znajdują się w kolekcji autora.

HENRYK SZOLTYS, Brynek



Nowe stwierdzenie *Protaetia (Cetonischema) aeruginosa* (LINNAEUS, 1767) (Coleoptera: Cetoniidae) na Górnym Śląsku

New record of *Protaetia (Cetonischema) aeruginosa* (LINNAEUS, 1767) (Coleoptera: Cetoniidae) from the Upper Silesia

Sporadycznie spotykany gatunek, związany ze starymi drzewami liściastymi, zasiedlający wysoko położone dziuple.

Z Górnego Śląska podawany był kilkakrotnie w XIX wieku (BURAKOWSKI et al. 1983. *Kat. Fauny Polski* 23(9): 1-294).

W tym roku przyniesiono mi okaz znaleziony w drewnitni na stosie trocin. Po nakarmieniu miąższem jabłka i zrobieniu zdjęć umieściłem go na kwiatostanie parzydła leśnego (*Aruncus sylvestris* KOSTEL.) w towarzystwie kilku *Protaetia cuprea* (FABRICIUS, 1775), po około 2 godzinach odleciał.

Gatunek ten objęty jest ochroną gatunkową.

Informacja dotyczy stanowiska: Brynek [UTM CA39], fot. 4 VII 2009.

HENRYK SZOLTYS, Brynek