

## D O N I E S I E N I A

## S h o r t n o t e s

***Rhodometra sacraria* (LINNAEUS, 1767) na Śląsku  
(Lepidoptera: Geometridae)***Rhodometra sacraria* (LINNAEUS, 1767) from Silesia (Lepidoptera: Geometridae)

*Rhodometra sacraria* (LINNAEUS, 1767) znany jest z obszaru całej Europy, lecz w większości krajów pojawia się jako migrant.

Po raz pierwszy został ten miernikowiec wykazany z Polski w 2002 roku z Karkonoszy (M. BOROWIAK, A. CHRZANOWSKI 2003. *Polskie Pismo ent.* 72: 99-103).

Jeden okaz *R. sacraria* został złowiony 19 VIII 2008 w Wiśle Jaworniku (Beskid Śląski) do światła ręciovki na polanie zbocza góry Czantoria [CA40] o godz. 23-ej (leg. H. Brzezina). Noc była ciepła i parna. Jest to z pewnością migrujący okaz z południa. Również jeden okaz tego gatunku złowił Witold Zajda (inf. ustna) w Kojszówce [DA00], w Beskidzie Makowskim, 24 VIII 2008 roku.

HENRYK BRZEZINA, Ustroń

**Nowe dla fauny Górnego Śląska gatunki motyli mniejszych  
(Microlepidoptera)**

Micro moths (Microlepidoptera) new to the Upper Silesia fauna

W wyniku dalszych badań lepidopterofauny Polski, znalazłem 6 nowych taksonów motyli, nieznanych dotąd z terenu Górnego Śląska:

1. *Tinea pallescentella* STAINTON, 1851 – wykazany dotąd z 6 województw, głównie z Polski zachodniej. Dwa okazy złowiłem w centrum Katowic [CA56] w piwnicy przedwojennego budynku. Dаты połowu: 2 XI 1995 i 11 VII 2009. Jest to pierwsze stwierdzenie tego gatunku na Górnym Śląsku.

2. *Tinea columbariella* WOCKE, 1877 - gatunek znany dotąd z 8 województw. Oznaczony na podstawie aparatu genitalnego, 1 ex Mysłowice-Ćmok [CA66], 20 VII 2009. Nie wykazywany dotychczas z Górnego Śląska.

3. *Argyresthia thuarella* (PACKARD, 1871) – znany dotąd z województwa zachodniopomorskiego, gąsienica minuje liście żywotnika zachodniego. Jeden okaz wyhodowałem z miny na *Thuja occidentalis*, Tychy [CA55], 28 V 2009 e.l.; larva V 2009, leg. G. Chowaniec. Ze Śląska dotychczas nie podawany.

4. *Elachista gleichenella* (FABRICIUS, 1781) – znany z 6 województw, głównie z pñ. wschodu kraju. Jeden okaz odłowilem w dzieñ na sródleñnej łace w lesie mieszanym, Mysłowice-Słupna [CA66], 11 VI 2009. Gatunek nowy dla Górnego Śląska.
5. *Cochylis nana* (HAWORTH, 1811) - znany z 8 województw, głównie w Polsce pñ. wschodniej. Gąsienica żeruje na brzozie. Dwa okazy złowilem na pniu *Betula sp.*, Mysłowice-Słupna [CA66], w dniach 6 V 2009 oraz 9 V 2009 w lesie mieszanym. Gatunek nieznany dotąd z Górnego Śląska.
6. *Grapholita discretana* WOCKE, 1861 – wykazany z 4 województw. Gąsienica żeruje na chmielu zwyczajnym (*Humulus lupulus*). Jedną samicę złowilem na płocie porośniętym chmielom, Mysłowice-Ćmok [CA66], 17 V 2009 w srodowisku ruderalnym. Takson nie podawany dotąd z Górnego Śląska.

Okazy dowodowe znajdujĄ się w zbiorach Muzeum Górnosławskiego w Bytomiu.

ADAM LARYSZ, Bytom



**Drugie stanowisko *Peribatodes rhomboidaria*  
(DENIS ET SCHIFFERMÜLLER, 1775)  
(Lepidoptera: Geometridae) na Górnym Śląsku**

The second locality of *Peribatodes rhomboidaria* (DENIS ET SCHIFFERMÜLLER, 1775)  
(Lepidoptera: Geometridae) in Upper Silesia

W czasie prac nad komasacjĄ zbioru motyli Muzeum Górnosławskiego w Bytomiu, natrafilem na okaz samca tego gatunku. Na etykietce znajdujĄ się następujĄce dane: „Brynnek Ober-Schlesien 23.7”. Niestety brak jest nazwiska autora. Jednak dane te pozwalajĄ na stwierdzenie, że motyl ten został złowiony w Brynku [CA39], w okresie międzywojennym.

Jest to drugie stwierdzenie *Peribatodes rhomboidaria* na Górnym Śląsku. Pierwszy raz został wykazany z Imielina k. Mysłowic [CA75] (LARYSZ, 2006-2007. *Acta ent. siles.* 14-15: 84)

ADAM LARYSZ, Bytom

