

***Agrilus derasofasciatus* LACORDAIRE, 1835**

Żywiec wzgórze Grojec [UTM: CA70], 24.05.2008, 1 ex.; 11.07.2008, 5 exx., na liściach winorośli, leg. et det. G. Jarosiewicz. W Beskidzie Zachodnim podawany do tej pory z okolic Cieszyna (WANKA TH. 1927. *Wien. Ent. Ztg.*, *Wien*, 44: 1–32.)

Okazy dowodowe znajdują się w mojej kolekcji.

GRZEGORZ JAROSIEWICZ, Żywiec
grzesjar@wp.pl



**Nowe stanowisko *Leptoglossus occidentalis* HEIDEMANN, 1910
(Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) w Polsce**

New locality of *Leptoglossus occidentalis* HEIDEMANN, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) in Poland

Ten duży (około 20 mm) pluskwiak, troficznie związany z sosnami (*Pinus* sp.), został zawleczony z Ameryki Północnej do Włoch w 1999 roku, skąd rozprzestrzenia się na inne kraje Europy. W Polsce po raz pierwszy stwierdzony w 2007 roku na dwóch stanowiskach: we Wrocławiu (Dolny Śląsk), oraz Miechowie (Wyżyna Małopolska) (LIS B., STROIŃSKI A., LIS J. A. 2008. *Coreoidea. Heteropt. Pol.* 1: 1–157). Dalsze lokalizacje to: Suchy Bór (Dolny Śląsk), Poznań (Nizina Wielkopolsko-Kujawska), oraz Kocoń (Beskid Zachodni) (HEBDA G. et al. 2010. *Heteropt. Pol. (Acta faun.)* 2: 15–18).

Nowe stanowisko:

Górny Śląsk: Brynek [UTM: CA39], 10.11.2012, 1 ex., leg. et det. H. Szoltys, złowiony nocą na murze budynku.

Okaz ten został przekazany do Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

HENRYK SZOLTYS, Brynek
henryk.szoltys@wp.pl

