

Doniesienia – Short notes

Nowe stanowiska *Ledra aurita* (L.) i *Cicadetta montana* (SCOP.) z Górnego Śląska (*Homoptera: Auchenorrhyncha*). [New records of *Ledra aurita* (L.) and *Cicadetta montana* (SCOP.) from Upper Silesia (*Homoptera: Auchenorrhyncha*)]

W zbiorach Muzeum Górnośląskiego znajdują się okazy dwóch gatunków piewików, które zbierane są bardzo rzadko i z tego względu zasługują na odnotowanie.

Ledra aurita (SCOP.):

- Brzezinka [CA 37], 12.09.1927, coll. KUNTZE – 1 okaz;
- Bytom–Dąbrowa Miejska [CA 47], 11.09.1932, coll. KUNTZE – 1 okaz.

Cicadetta montana (L.):

- Bytom–Dąbrowa Miejska [CA 47], 5.07.1944, coll. S.TOLL – 1 okaz;
- Lubliniec [CB 31], 18.06.1958, leg. L. SAWKIEWICZ – 1 okaz
- Tarnowskie Góry [CA 48], maj 1904, coll. KUNTZE – 3 okazy oraz 5 wylinek;
- Tworóg [CA 39], 06.1936 (?), leg. H. NOWOTNY – 2 okazy.

W katalogu piewików Polski z 1976 roku brak jest stanowisk obu tych gatunków z terenu Górnego Śląska. W zbiorach Katedry Zoologii Uniwersytetu Śląskiego znajdują się pojedyncze okazy *Ledra aurita* (SCOP.) zebrane przez magistrantów lecz dotychczas informacje o nich nie zostały opublikowane. Ze względu na preferencje środowiskowe informacje o istniejących współcześnie jak i historycznych stanowiskach obu tych gatunków należą do niezwykle cennych.

Roland Dobosz, Bytom

Pierwsze na Dolnym Śląsku stanowisko *Aphelocheirus aestivalis* (F.) (*Heteroptera: Aphelocheiridae*). [The first record of *Aphelocheirus aestivalis* (F.) (*Heteroptera: Aphelocheiridae*) in Lower Silesia]

Opracowując kolekcję wodnych pluskwiaków różnoskrzydłych znajdującą się w zbiorach Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, natrafiłam na dwa okazy rzadko odławianego na południu Polski gatunku – *Aphelocheirus aestivalis* (F.). Etykiety lokalizacyjne zawierały następujące dane: Szczodre [XS 75] k. Wrocławia, rzeka Dobra, 4.10.1988. leg. J. BŁACHUTA.

Jest to pierwsze stanowisko tego gatunku na Dolnym Śląsku. Na południu Polski znany poza tym tylko z okolic Otmuchowa (Sudety Wschodnie) oraz rzeczki Bajerki w Beskidzie Zachodnim. Liczniej i częściej odławiany był do tej pory z Pojezierza Pomorskiego i Mazurskiego, Niziny Wielkopolsko–Kujawskiej i Mazowieckiej oraz na Podlasiu.

Barbara Lis, Katowice

Nowe stanowiska *Acrocer orbicula* (F.) (*Diptera: Acroceridae*) na Górnym Śląsku i Pojezierzu Pomorskim. [New records of *Acrocer orbicula* (F.) (*Diptera: Acroceridae*) from Upper Silesia and Pomerania Lakeland]

Muchówki z rodziny *Acroceridae* są do bardzo rzadko łapano w Polsce. Są one pasożytami pajaków lub kokonów pajęczych. Wygląd ich jest tak charakterystyczny, że nie można pomylić ich z żadną inną grupą muchówek występujących w Polsce. Dotychczas w naszym kraju stwierdzono występowanie 9 gatunków z ok. 30 znanych w Europie. Pierwsze opublikowane informacje o *A. orbicula* w Polsce pochodzą z Pienin. W lipcu 1981 roku złapałem jeden okaz tego gatunku na łące w Kaliszu Pomorskim [WV 50]. W ok. Lublińca [CB 30] przy drodze śródleśnej, 9.07.1993, złapałem samicę *A. orbicula*.

Roland Dobosz, Bytom