

*Phyllodesma ilicifolia* (L.) została umieszczona w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt – Bezkręgowce z kategorią CR – gatunek skrajnie narażony na wyginięcie, jednocześnie nie należy do gatunków objętych ochroną prawną.

Nowe stanowisko:

**Górny Śląsk:** obszar leśny pomiędzy miejscowościami Tworóg i Brusiek (UTM CB 40), teren po zrębie zupełnym; w siedlisku boru świeżego. W dniu 10 V 2013 na krzewinkach borówki czarnej *Vaccinium myrtillus* (L.) znaleziono jeden okaz samicy, składającej jaja. W warunkach domowych otrzymano około 30 jaj. Pierwsze gąsienice pojawiły się 20 V 2013. Karmiono je liśćmi borówki czarnej. Po około pięciu tygodniach gąsienice dorosły i rozpoczęły tworzenie kokonów. Poczwarki przetrzymywane są obecnie w warunkach przypominających naturalne.

TOMASZ BIWO, Pyskowice

baiwo1@wp.pl

TADEUSZ BZIUK, Ruda Śląska

tadeusz.bziuk@poczta.fm



### Nowe dane dotyczące rozmieszczenia *Phengaris* (= *Maculinea*) *arion* (LINNAEUS, 1758) w Polsce (Dolny Śląsk, Sudety)

New data on the occurrence of *Phengaris* (= *Maculinea*) *arion* (LINNAEUS, 1758) in Poland (Lower Silesia, Sudety Mts.)

*Phengaris arion* (L.) to myrmekofilny gatunek modraszka, ustępujący ze swoich stanowisk w całej Europie. Dawniej występował na całym obszarze Polski (WOLF 1928. Die Großschmetterlinge Schlesiens. Breslau 2: 333 pp.; ROMANISZYN 1929. [In:] Fauna motyli Polski I. Prace monograficzne Komisji Fizjograficznej PAU. Kraków 6: 552 pp.). W Polsce obecnie zachodnia granica zasięgu gatunku przebiega od Pojezierza Suwalskiego przez okolice Warszawy i Łodzi aż po Góry Śląsk (BUSZKO 1997. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce 1986-1995. Toruń: 170 pp.; BUSZKO, MASŁOWSKI 2008. Motyle dzienne Polski. Nowy Sącz: 274 pp.; WARECKI 2010. Motyle dzienne Polski – Atlas bionomii. Nowy Sącz: 132 pp.).

Literatura z ostatnich lat nie podaje *Phengaris arion* z zachodniej części kraju. Był on jednak obserwowany w miejscowości Bielawa [UTM: XS11], trzykrotnie w ostanich latach: 13.07.2009, 1 ♂, 02.08.2011, 1 ♀ i 30.07.2012, 1 ♂, na jednym stanowisku, na zboczu wzgórza (500 m n.p.m.) o wystawie wschodniej i południowej, porośniętym macierzanką *Thymus* sp. i innymi roślinami kserotermicznymi. *P. arion* był również widziany na jednym z osiedli w Wałbrzychu w 1976 r., w liczbie 10-15 imagines (B. SOUREK, inf.ustna). W *Polskiej czerwonej księdze zwierząt* (BUSZKO 2004). *Maculinea*

*arion*. [In:] GŁOWACIŃSKI Z., NOWACKI J. (Eds.), *Bezkręgowce*. Kraków-Poznań: 248 pp.) sklasyfikowany jako gatunek zagrożony EN – endangered. W Polsce prawnie chroniony

PAWEŁ CZUDEK, Rzeszów  
cumel@op.p

## ERRATA

### SPIS TREŚCI – CONTENTS

*Acta ent. siles.* 20, 2012: 3, tył okładki

Strona	Wiersz	Jest	Powinno być
3	21 od dołu	New localities of <i>Cerambyx scopoli</i> (FUESSLY, 1775) (Coleoptera: Cerambycidae) in Poland	Rozmieszczenie <i>Rhaphuma gracilipes</i> (FALDERMANN, 1835) (Coleoptera: Cerambycidae) w Europie
3	22 od dołu	(Coleoptera: Cerambycidae) in Europe with a new records	(Coleoptera: Cerambycidae) in Europe
tył okładki	10 od dołu	New localities of <i>Cerambyx scopoli</i> (FUESSLY, 1775) (Coleoptera: Cerambycidae) in Poland	Rozmieszczenie <i>Rhaphuma gracilipes</i> (FALDERMANN, 1835) (Coleoptera: Cerambycidae) w Europie
tył okładki	11 od dołu	(Coleoptera: Cerambycidae) in Europe with a new records	(Coleoptera: Cerambycidae) in Europe