

***Dacne pontica* (BEDEL, 1868) (Coleoptera: Erotylidae) – nowy gatunek w faunie Polski**ROMAN KRÓLIK<sup>1</sup>, STANISŁAW SZAFRANIEC<sup>2</sup><sup>1</sup>ul. Mickiewicza 8, 46-200 Kluczbork, e-mail: agrilus@poczta.onet.pl<sup>2</sup>Babiogórski Park Narodowy, Zawoja 1403, 34-223 Zawoja, e-mail: jafer@wp.plABSTRACT. *Dacne pontica* (BEDEL, 1868) (Coleoptera: Erotylidae) – new species for the Polish fauna.*Dacne pontica* (BEDEL, 1868), collected in the Roztocze, is reported for the first time from Poland.KEY WORDS: Coleoptera, Erotylidae, *Dacne pontica*, new record, Roztocze, Poland.

Rodzaj *Dacne* LATREILLE, 1797 jest reprezentowany w Europie przez 6 gatunków (WĘGRZYNOWICZ 2007), w tym 1 introdukowany gatunek wschodniopalearktyczny. Z terenu Polski zostały wykazane dotychczas 3 gatunki: *D. bipustulata* (THUNBERG, 1781) – pospolity w całej Polsce, oraz dużo rzadsze na terenie naszego kraju *D. notata* (GMELIN, 1790) oraz *D. rufifrons* (FABRICIUS, 1775) (BURAKOWSKI et al. 1986, MAZUR 1983).

Kolejny gatunek, *Dacne pontica* (BEDEL, 1868) został odkryty w Polsce na poniższym stanowisku:

**Roztoczański Park Narodowy**, Bukowa Góra [UTM: FB30], 08.07.1999, 3 exx. w towarzystwie okazów *D. bipustulata*, leg. Stanisław Szafraniec, det. Roman Królik.

Gatunek ten rozprzestrzeniony jest w zachodniej Palearktyce. Znany jest z Kaukazu, gdzie wydaje się być dość liczny; ponadto wykazany został z Europy środkowej i zachodniej: Austrii, Bośni i Hercegowiny, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch oraz z Azji: Iranu i Turcji.

Najlepszą cechą różniącą *D. pontica* (ryc. 1) od *D. rufifrons* (ryc. 2) to duże i wyraźnie odgraniczone plamy barkowe. Klucz do rozróżniania wszystkich gatunków wykazanych do tej pory z Europy środkowej zawiera praca: SCHMIDL (1995).

Okazy dowodowe znajdują się kolekcjach autorów.

## PIŚMIENNICTWO

- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1986: Chrząszcze – Coleoptera. Cucujoidea, cz. 2. *Katalog Fauny Polski* 23 (13): 278 pp.
- WĘGRZYNOWICZ P. 2007. Erotylidae [In:] LÖBL I., SMETANA A. (Eds.), *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*. Vol. 4. Elateroidea – Derodontoidea – Bostrichoidea – Lymexyloidea – Cleroidea – Cucujoidea. Apollo Books, Stenstrup: 935 pp.
- MAZUR S. 1983. Zadrzewkowate – Erotylidae, Wyglodkowate – Endomychidae. *Klucze do oznaczania owadów Polski* 19 (74–75): 31 pp.
- SCHMIDL J. 1995. *Dacne picta* CROUCH, 1873 – eine für Mitteleuropa neue Adventivart (Coleoptera: Erotylidae). *Koleopterologische Rundschau* 65: 179–181.



Ryc. 1. *Dacne pontica* z Polski.  
Fig. 1. *Dacne pontica* from Poland.



Ryc. 2. *Dacne rufifrons* z europejskiej części Turcji (oryg.).  
Fig. 2. *Dacne rufifrons* from European part of Turkey (oryg.).