

DONIESIENIA

Short notes

Nowe stanowiska *Apterona helicoidella* (VALLOT, 1827) (Lepidoptera: Psychidae) w Polsce

New localities of *Apterona helicoidella* (VALLOT, 1827) (Lepidoptera: Psychidae) in Poland

Apterona helicoidella znany jest z Europy, zachodniej Azji, północnej Afryki i USA (SOBCZYK T. 2011. Psychidae (Lepidoptera). *World catalogue of insects* 10: 476 pp.). W Polsce stwierdzony w zachodniej, środkowej i południowo-wschodniej części kraju (BUSZKO J., NOWACKI J. 2000. *Polish entomological monographs* 1: 1–178).

W miejscu występowania bywa liczny. Rozwój jednoroczny, zimują gąsienice pierwszego stadium. Żerują od wiosny do czerwca/lipca. W Polsce występuje wyłącznie forma partenogenetyczna, na zachodzie Europy (Alpy) występuje również forma biseksualna.

Nowe stanowiska:

– Chrząszczewek (woj. łódzkie) [DC64], 03.06.2010, 4 puste koszyczki na słupie trakcji kolejowej, leg. G. Banasiak.

– Skierniewice [DC45], 04.06.2010, 40 koszyków na słupach trakcji kolejowej oraz transformatorach PKP w pobliżu torów kolejowych, leg. G. Banasiak. Z zebranego materiału wylęgły się trzy samice 03.07.2010. W kolejnych latach liczebność koszyczków na tym stanowisku przekraczała tysiąc sztuk.

– Nowy Dworek (woj. lubuskie) [WT39], 30.07.2014, 3 koszyczki na bylicy polnej *Artemisia campestris*, leg. M. Młeczak, nieczynne torowisko kolejowe porośnięte roślinnością kserotermiczną.

Okazy dowodowe znajdują się w kolekcjach autorów.

MARIUSZ MŁECZAK, Nowy Dworek
mmleczak@o2.pl

GRZEGORZ BANASIAK, Skierniewice
bangr@ld.onet.pl

Accepted: 7 January 2015; published: 14 January 2015

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl>