

DONESIENIA

Short notes

***Gastrallus laevigatus* (OLIVIER, 1790) (Coleoptera: Ptinidae) na
Górnym Śląsku**

Gastrallus laevigatus (OLIVIER, 1790) (Coleoptera: Ptinidae) in Upper Silesia

Gastrallus laevigatus (Olivier, 1790) to gatunek kołatka, który w Europie zasiedla głównie kraje wokół Morza Śródziemnego. Na północ sięga po Danię, Holandię i południowe obszary Europy Środkowej. Związany ze starymi drzewami liściastymi, jego rozwój stwierdzono w korze buków (*Fagus* sp.), dębów (*Quercus* sp.), wiązów (*Ulmus* sp.) oraz w jemiolu (*Viscum album* L.). Z terenu Polski podany z czterech krain (BURAKOWSKI B. *et al.* 1986. *Katalog Fauny Polski* 23(11): 1–243.) na podstawie dawnych danych.

Na Górnym Śląsku wykazany w XIX wieku z Łubowic k. Raciborza (REITTER E. 1870. Uebersicht der Käfer-Fauna von Mähren und Schlesien. *Verhandlungen des naturforschenden Vereins in Brünn*, 8, 2, str. III–VIII, 1–195.). Współcześnie został wykryty na stanowisku nieopodal Łubowic:

Babice, gm. Racibórz [CA 06], 12-18.06.2015, 5 exx., cult. J. Grzywocz.

Okazy wyhodowano z jemioly współzasiedlonej przez innego kołatka - *Ptinomorphus imperialis* (LINNAEUS, 1767), który wylęgał się o miesiąc wcześniej. Żerowiska usytuowane były w najgrubszych fragmentach starych, martwych pędów.

Egzemplarze dowodowe znajdują się w zbiorach Muzeum Górnos Śląskiego w Bytomiu oraz autora.

JANUSZ GRZYWOCZ, Ruda Śląska
grzywocz.a.j@wp.pl

Accepted: 23 September 2015; published: 10 November 2015

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl>